

9月1日は防災の日

～地震から身を守ろう～




問い合わせ 地域安全課(☎27444)

地震は台風などの風水害と違い、突然発生します。いつ、どのように起きるか分からない地震から身を守るためには、事前の備えが重要となります。

家の安全対策

- 家具の転倒防止のため、「L字金具」や「滑り止めシート」で固定する
- 家具などの上に物を置かない
- ガラスの飛び散りを「飛散防止フィルム」などで防止する



自分の身を守る

防災は、一人一人が自分の身を守る「自助」が基本となります。地震が発生したとき、どのように行動すれば身の安全を守れるかなどを知っておきましょう。平常時より、家の中での安全対策や家庭内備蓄を進めることで家族の身を守ることに繋がります。

建物の外での注意点

- 地震発生時は以下の物には近づかない
 - ブロック塀、自動販売機など倒れそうな物
 - 看板やビル、住宅といった建物のガラス
- 施設などでは
 - 係員の指示に従い、出口などに殺到しない
 - 天井につらわれている物から離れる

備蓄品は3日分を用意!

救援物資が届くにはおおむね3日かかるといわれています。非常時の持ち出し品は必要最低限なものにしてリュックサックなどにまとめ、すぐに取り出せる場所に保管しておきましょう。

- 家族の役割分担も考えて、1人1つの非常時持ち出し袋を用意しましょう
- 非常時持ち出し品は高齢者や乳幼児などの家族構成に合わせて必要なものを加えておきましょう
- 非常時持ち出し品は保存状態や使用(賞味)期限などを定期的に点検し、必要に応じて交換しましょう

非常食品

- 栄養補助食品・缶詰
- 飲料水 など

生活用品

- 厚手の手袋・軍手
- 毛布
- 生理用品
- 携帯用トイレ
- ライター・マッチ

衣料品

- 下着・靴下
- 長袖シャツ・長ズボン
- 防寒用ジャケット
- 雨具

救急用具

- 救急箱
- 持病の薬
- 処方箋の控え


感染症対策物品

- マスク
- 消毒液



新型コロナウイルス関連情報


問い合わせ 市コロナワクチンコールセンター(☎027・212・4722) 健康づくり課(☎21211(代表))



オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの準備を進めています

国や市では、オミクロン株(BA.1)と従来株に対応する2種類を組み合わせた2価ワクチンを接種する準備を進めています。

接種の開始時期は今年の10月半ば以降となる見込みです。そのため現行のファイザー社ワクチンやモデルナ社ワクチンは切り替えのため数量が限られていて、特にファイザー社ワクチンは非常に予約が取りにくい状況です。重症化リスクのある人は、ワクチンを選ばず早期接種を検討してください。



鬼石病院で武田社ワクチン(ノバボックス)の接種を開始します

武田社ワクチン(ノバボックス)は1~3回目の接種に使用できる国産の組み換えタンパクワクチンです。組み換えタンパクワクチンは不活化ワクチンの一種であり、日本においてもB型肝炎ウイルスワクチンなど、他のワクチンでの使用実績があります。市内でも、次のとおり接種を開始します。

開設日時 9月26日(月)午後2時~(予約開始日時:9月13日(火)午前9時~)

会場 鬼石病院

予約 無料通信アプリLINE(ライン)または電話で予約してください

▷LINE予約 県LINE公式アカウント「群馬県デジタル窓口」から予約

▷電話予約 市コロナワクチンコールセンター(☎027・212・4722)に電話で予約

※日曜日・祝日を除く午前9時~午後6時

定員 50人

対象 次の1・2・3回目の接種対象に該当する人(4回目接種に用いることはできません)

1 初回接種(1・2回目)

接種対象 新型コロナワクチン未接種で、初回接種として武田社ワクチン(ノバボックス)の接種を希望する12歳以上の人

接種回数 2回(1回目・2回目接種)

接種間隔 1回目の接種後原則として3週間



3 追加接種(3回目)

接種対象者 武田社ワクチン(ノバボックス)以外の新型コロナワクチンを2回接種済みで、3回目接種として武田社ワクチン(ノバボックス)の接種を希望する18歳以上の人

接種回数 1回(3回目接種)

接種間隔 他種のワクチン2回目の接種後、少なくとも6カ月以上

2 交互接種(2回目)

接種対象 武田社ワクチン(ノバボックス)以外の新型コロナワクチンの1回目接種後に重篤な副反応が生じ、医師から前回接種を受けたワクチンと同じワクチンを次回に接種することが困難であると判断された人で、2回目接種として武田社ワクチン(ノバボックス)の接種を希望する人

接種回数 1回(2回目接種)

接種間隔 1回目の接種後原則として4週間